

1^{re} Observation

Au mois de may, 1741, un homme Distingué De La
 Ville de Presbourg en Hongrie, vint me prier d'aller voir son
 fils âgé de six ou sept ans fort et robuste qui quelques jours avant
 étoit attaqué d'une douleur violente dans toute la partie antérieure
 de l'avant bras gauche et dans tout le voisinage; Je trouvay cette
 partie et la main tendues avec Inflammation, pulsation, fièvre
 et tous les Symptômes d'un Phlegmon, Sur lequel J'appliquay un
 Cataplasme anodin; la saignée fut faite, observant des règles qu'il
 ayent égard à l'âge et à la force du malade; deux heures après
 on luy donna un lavement d'une decoction d'orge avec le miel Violat
 Je luy fis boire d'une tisane faite avec les Racines d'Alca, de Spicend
 de Belle de Jeune dans laquelle Je luy ferois dissoudre du sirop de
 groseilles, la diète humectante et rafraichissante ne fut point omise
 La douleur se calma et la tension diminua 24 heures après cette
 méthode, la fièvre moins violente; Je substituy à le Cataplasme de
 maturatif pour digérer, préparer, et rassembler les matières en une
 tumeur sensible au doigt du troisième Cataplasme et
 l'abris en état d'être ouvert; Je fis remarquer aux parents la nécessité
 de l'opération à la quelle ils consentirent, à que J'excutay à la
 faveur d'un grand boy de cannelé; Je fis l'ouverture de deux boyes
 de biseau; Il sortit une grande quantité de pus blanc et bien conditionné
 Je pansay avec le charpie de l'écume de lait Je prescrivis un Julep
 calmant par le moyen de quelques dragmes de sirop de diacode; Le
 malade passa la nuit plus tranquillement que je ne me le étois imaginé
 Je levay le premier appareil 24 heures après; J'appliquay le second
 avec des bourdonnets et plumaceaux chargés d'un digestif ordinaire



ARC 47

n° 72

(2A)

L'emplâtre de diapalme disposé en forme de frappe; les compresses & un
 bandage contentif, la situation de la partie conformé à celui du malade
 cette méthode fut continuée, persuadé de voir terminer heureusement ces
 abus dans le cours de 18 jours ou trois semaines; Je fus trompé, quoique
 sans sortir des règles prescrites par Lard; les matières bien conditionnées
 changèrent de couleur et de consistance, les bords de la plaie devinrent
 mollasses; le malade faible, et latente; Je n'omis rien pour soutenir les
 forces; j'employai les mondifiants que je crus les plus convenables, tant
 simples que composés, les détensifs salins & balsamiques furent mis en
 usage, les consolidans de différens genres ne furent pas oubliés, Je pensai
 mollement avoir des plumasseaux chargés, des baumes, unguens, liqueurs
 tout sans fruit, je mis le malade à l'usage des vulnéraires balsamiques
 des opiacés absorbans, des bouillons, de l'eau d'orge, de celle d'avoine; de la
 decoction de squin, rien ne réussit; Je remarquai qu'un sinus vers l'os
 supérieur fournissoit du pus considérablement, et qu'il pouvoit devenir
 la source de tous les troubles qui augmentoient; Je soulevai une sonde fine
 dans l'ouverture, et de deux coups de bistouri je le dilatai, je continuai
 le pansement avec deux bourdonnets dans le fond de mes dernières incisions
 Il me passa quelques jours après que les matières étoient moins épaisses
 le petit changement me fit espérer, quoique les douleurs augmentassent
 au point que mon petit malade eut quelques mouvemens convulsifs; sur
 lesquels je me tins en garde en réfléchissant aux événemens les plus fâcheux
 qui n'eurent aucune mauvaise suite tout se calma; le petit malade dir qu'il
 ne lui faisoit bien du mal. Lorsque je portois un bourdonnet dans le fond
 du sinus ouvert en dernier lieu, Je crus effectivement que quelques esquilles
 détachées du radius y étoient des parties susceptibles de faire naître telle dou-
 leur pour m'en assurer je portai l'indicateur dans le fond de l'ulcère pour
 reconnaître la nature et la figure de ce corps étranger; Je me sentis piquer
 le doigt vivement, en conséquence de quoi je fis mon possible pour le tirer
 avec le moins de douleur qu'il me fut possible pour cet effet je donnai
 quelques petits coups de bistouri le dos appuyé sur l'ongle de l'indicateur gauche

quand je fus avoir après de gage le corps étranger, je pris de pincette
à disquer en forme de plume à écrire, afin de mieux saisir l'extrémité,
mais quelle fut mon étonnement de voir mes pincettes chargées
d'une aiguille àoudre toute pleine d'acide, de même que si elle fut
séjournée dans un fétor; le phénomène me fit faire différentes
questions aux Larins, aux Domestiques, chez les amis & voisins
que le d'enfant fréquentait; je ne pus faire aucune découverte qui
me donnât un indice, de la manière avec laquelle cette aiguille étoit
parvenue dans le bras; l'enfant ne fit jamais plaindre rien de douleur
ni d'inquiétude dans aucune partie de son corps, la cure se termina
promptement et l'enfant bientôt rétabli.

11. Observation

Le 10^e jour de juin 1748 un trouillard de la garde de S. A. R. M^{te}
les D^{ns} Charles de Lorraine, reçut un coup de fusil à la partie
antérieure et supérieure moyenne du bras droit qui lui fracassa l'humérus.
Je fis les dilatactions nécessaires, il sortit plusieurs esquilles; dont je
trouvai encore quelques-unes; je cherchai la balle, je ne la trouvai pas.
Je réduisis la fracture; je fis une embrocation d'huile pénétrante
et résolutive animée d'esprit de vin; je couvris la playe de plumaceau
chargé de baume d'arum disposé dans le creux de la dite embrocation
un emplâtre de Stora, et le bandage à 8 chefs, les diversions furent
faites, le Régime fut à quatre bouillons dans les 24 heures, les lavemens
les tisanes furent administrés à propos, le lendemain je fis saigner
le blessé pour la troisième fois, il avoit de la fièvre, je levai l'appareil
je cherchai encore la balle dans toute la circonférence du bras, à la
partie inférieure et supérieure, sous l'aisselle, j'interrogeai le blessé
mais je ne découvris rien, le bras étoit dans l'état naturel, sans
inflammation, gonflement ni tension; le quatrième jour de la blessure
la suppuration devint sanieuse, de mauvaise odeur, le pou dur, les yeux



lyaris, le qui me déterminait à prescrire une quatrième saignée qui fut
faite le soir du cinquième jour; le blessé se plaignoit de la poitrine; la
douleur augmenta pendant la nuit; Je subordonnai la balle dans la
poitrine; J'avois bien de me le persuader; mon pronostic fut fait dans l'instan-
t en disant qu'il periroit infailliblement, en effet Il mourut de huitième du jour
recu, Je fis l'ouverture de son cadavre en commençant ma dissection sur la
fracture pour mieux reconnaître de trajet de la balle, Je parvins sous l'aisselle
menagant les vaisseaux que je trouvoy ^{endurcis} ~~si~~ remarquay une sinuosité
profonde le long de la tète de l'humérus en dessous faite par le passage
de la balle, sans avoir intéressé la cavité dans laquelle la tète de l'os du
bras s'appuie; Je ne m'aperçus de la ditte sinuosité qu'en relevant ~~extrême~~
~~le~~ le bras du cadavre; J'ouvris la poitrine en continuant cette met hode
Je m'aperçus alors que la balle étoit entrée dans cette capacité directement
entre les branches du scalen, muscle du col; Je m'imaginay qu'elle étoit tombée
sur le diaphragme le fut aussi ou je la trouvoy placée sur le muscle à l'angle
qu'il forme avec le médiastin à sa pte antérieure avec un abcès considérable
et le lobe du poulmon déchiré, & coupé à sa pte inférieure; la balle étoit
d'une figure très irrégulière brisée de points et de treneaux, Il y avoit
un abcès dans la substance du poulmon, La matière étoit d'une puanteur
insupportable; Le blessé n'avoit point vomio ny craché de sang, aucun
signe d'épanchement sur le diaphragme; La difficulté de respirer ne parut
qu'au commencement du cinquième, Le ventre étoit ny remoré ny relâché les
urines un peu foncées, assés proportionnées à la quantité de boisson, tous
Les autres viscères dans leur état naturel

III Observation

Au mois de juin de la même année un bonzard recu un coup
de fusil, l'entrée étoit à trois doigts au dessous de l'angle inférieure de
l'omoplatte droite, la sortie à six vers la pte antérieure de la poitrine
plus basse que l'entrée, vis à vis le cartilage de la seconde fausse cote s'ouvrant

51

de haut en bas, la balle avoit passé au travers du grand dorsal
 Je fis les dilatations; je pansay les playes sans tamponner, les
 diversions furent de pres; les playes étoient sans gonflement
 inflammation; ny emphysème; le blessé ne faisoit point de sang
 Il ne sortoit ny sang ny serosité des playes; Il étoit sans fièvre
 sans douleur, le 2^e état dans lequel je le trouvoy 24 heures après
 le blessure que je le vis la 1^{re} fois, Je pris les mesures les plus
 justes pour qu'il ne manquât rien dans les pansements des blessés
 commis à mes soins; Je continuay à le panser mollement avec
 le baume d'arcus, la balle n'avoit point pénétré dans la poitrine ce
 qui me faisoit regarder les playes comme simples, quoique je ne
 négligassé rien pour éviter et prévenir les accidens inséparables aux
 playes d'armes à feu; Je mis tout en usage pour procurer la chute de
 l'écorce; mais bien loing d'y parvenir, les playes devinrent seches et
 arides; J'employay les digestifs les plus convenables, les suppuratifs
 les plus puissans, Les Cataplasmes Emolliens et relachans, Je scarifia
 l'entrée et la sortie, tout fut inutile Je visitay le blessé quatre fois par
 jour; Je ne trouvoy aucun changement dans le pou qui étoit égal
 doux; en fin dans un état naturel. Il ny avoit aucun symptôme
 d'apoplexie sur le diaphragme; Je voulus m'en assurer par les
 différentes situations que je fis prendre, levé, couché sur le dos sur
 le côté droit comme sur le gauche, toutes ces positions luy étoient
 égales; point de difficulté de respirer pas même de toux, parlant
 à son ordinaire, et mourut le lendemain de neuvième jour sans
 que les playes eussent donné la moindre humidité.
 Je prouvay à l'ouverture du cadavre; après avoir ouvert la poitrine
 Je fus surpris de ne point trouver le lobe du poulmon du côté blessé
 tout étoit détruit, avec un épanchement considérable de serosité
 sanguinolente, la plèvre gangrenée, le foie presque tout fétideux
 avec un abcès dans la substance, L'estomac très petit, ce fut



6/ par l'ouverture de cette capacité que je fus assuré, que la balle avoit coulé de long des Costes sans y penetrer; J'examinay les costes intercostalles elles étoient jointes & endommagées; des Costes dans leur entier; Je pensay faire la parallèle de ce coup à ceux que l'on reçoit au flanc ou chinty qui occasionnent une sommation du furoeu sans quil y ait fracture; dont les Suites sont des plus fâcheuses. qui sont peries par un abcès dans la propre substance.

IV Observation

Le 9. d'Avril 1745, un brouillard fut attaqué par plusieurs qui lui donnèrent trois coups de Sabre, le premier fut appliqué à la partie moyenne et externe du bras gauche, playe à lambeau de quatre travers de doigts, Le second fut porté orizontalement à la pte Sup^{re} du parietal droit qui n'entamait que les Cygumens, autre playe à lambeau, Le troisieme étoit à la pte laterale gauche du frontal, l'angle inf^{re} commençoit trois doigts au dessus de la racine du nez en montant obliquement vers le parietal gauche de la longueur de trois bons pouces; Le Chirurgien qui le vit une heure après suivit l'indication des playes recentes faites par des instrumens tranchans en consequence de quoy il fit trois points de suture entrecoujée à cette dernière playe; Le rapport me fut fait de trois playes simples; le blessé avoit été saigné; J'allay le visiter l'après-matin; je fus étonné de trouver son pou dur et fier; J'examinay les playes; Je trouvay les deux premieres en assez bon état; Il n'en étoit pas de même de la troisieme dont les levres étoient gonflées et enflammées; toute la circonférence occidenteuse Je coupay des points de suture* en glissant une Sonde creuse entre la peau et les lins, pour reconnoître la nature et la profondeur; Je soup^{er} penetrer dans la substance osseuse; Je dilatay les angles tant pour découvrir la fracture que pour tendre et relâcher le périoste; Je

7
m'aperçus que la fracture continuo son progrès sous les
legumens, tant haut que bas; après comme j'étois de la
grandeur de la maladie; Je pençay le blesé, et me munir des
Conseils des gens de l'art après l'application de l'appareil qui fut
de laisser tomber de l'esprit de vin dans l'intervalle de la fracture
un plumaceau sur les Imbibé de la même liqueur, plusieurs autres
chargés de baume d'arceus, de tous couvris deemplâtre de betoine
soutenus du grand couvre chet; Je fis saigner le blesé; Il fut mis
à une diète stricte, de vin blanc &c. La saignée fut répétée quatre heures
après, qui étoit la troisième; Je levay l'appareil vers le soir en présence
de deux Chirurgiens majors et un médecin, nous trouvâmes la plaie
sans gonflement sans inflammation et presque sans douleur, sans
accidens ny aucun signe d'empêchement sur la dure mere, quoique cela
pût être nécessairement retenu pas possible qu'une plaie pénétrante
dans la substance du cerveau qui avoit coupé la dure et pie mere
fût sans épanchement; d'autant plus confirmatif que je regardois
l'ouverture du crâne plutôt comme fracture que plaie; quoique les accidens
primitifs manquassent pour nous décider à l'opération du trepan; je
concluay que les Consecutifs paroîtront mais que nous aurions échappé
l'instant favorable, des Consecutifs ne furent pas de mon sentiment
alléguant qu'il falloit attendre que les accidens déterminassent à l'opération
J'ajoutay que je prévois que les mêmes accidens qu'ils vouloient
attendre, devroient être regardés les précurseurs d'un mort assuré.
Le blesé fut saigné copieusement pour la quatrième fois, des playes
du bras et celle de la tête se réunissoient; enfin le 13 Il eut des mouvemens
convulsifs après lesquels Il tomba dans un apoplexie et stargique
et puis Il eut un délire affreux; Je le fis saigner de la gorge et du pied
J'appliquay sur toute la tête un cataplasme emollient et relâchant
les boissons nitreuses, les lavemens tous froids mis en usage; les accidens
se calmèrent, Je profitay de cet interval pour appliquer le trepan
Je fis les incisions nécessaires pour découvrir le crâne, en allongeant



9
L'angle Supérieur, et du centre de la levre Inférieure je fis d'incision en T
Je vus dire qu'en plongeant la pointe du bistouri à un doigt derrière l'oreille
Je vins de bas en haut finir dans le milieu de la plaie; Je renversai les
deux angles, Je tirai quelques Esquilles détachées du frant, J'apparus alors le
jet d'une petite artère qui donnoit au travers de la fracture; une fistule
qui survint au blessé de six jours une heure après, le cinquième de la blessure.
Je fis l'ouverture du frant en sciant les os également et doucement, Je trouvai à
son ouverture une plaie pénétrante dans la substance corticale, longue de deux
doigts, profonde de trois à quatre lignes, une inflammation considérable, une
disposition gangreneuse à la dure mere; sur laquelle Je trouvois très peu de pénétrant
La fracture commençoit à la partie postérieure du parietal à quelque distance de
la suture Lambdaïde traversant le frontal, le long de l'orbite, et finissant dans
le corps du sphénoïde; Je ne remarquai rien dans les Sinus, les Corps Callus
dans un état naturel, l'œil net et ny gonflé ny enflammé, ny douloureux

V Observation

Au commencement de décembre 1745 M^{rs} le Marquis de . . . tomba
sur la glace directement à la partie latérale droite du frontal; Il resta
étendu sur la place sans connaissance, sans sentiment ny mouvement; le
sang coula du nez et des oreilles; Il fut porté dans cet état dans son
quartier, le Chirurgien qui fut appelé visita toute la tête; Il ne remarqua
aucune plaie ny contusion, mais un enfoncement considérable du frontal
une dépression semblable à celle d'un gros dévau traversant obliquement de
plus de deux travers de doigt de long sur un de largeur; le vomissement survint
un moment après; on saigna le blessé; des eaux cordiales et spiritueuses furent
prodiguées; au moyen desquelles la connaissance et le mouvement revinrent;
le sang cessa de couler du nez et des oreilles; Il se plaignoit d'une grande
douleur et pesanteur de la tête qui fut rasée, sur laquelle on appliqua des
compresses trempées dans l'eau de vie, on transporta le malade sur une
litière à cause des marches penibles qu'il étoit obligé de faire pour suivre

9
L'armée dans une saison et un pays rigoureux, cette situation
fut assez près la même sans un notable changement jusqu'au six
de la suite que le blessé eut un délire affreux; logé chez un paysan
dans un hameau, on le fut appelé à son secours la première fois
après avoir examiné le malade; Je fus qu'il n'avoit pas une heure
à vivre, avec un pou dur, les yeux enflammés, le visage rouge; Je le
fis saigner sur le bras, de la gorge et du pied; après les-
quelles Je fis préparer un bain, où il resta près d'une heure sans
faiblesse; J'appliquay un Cataplasme de tout ce que Je pus trouver
de plus propre pour ramollir et relacher la grande tension des tegmens
qui recouvrent de France; J'avois résolu de faire les incisions pour
appliquer une couronne de trepan dans l'intention de relever l'enfoncement
Lorsque six heures après Je retournay chez le malade que Je trouvoy
tranquille, plein de sommeil, mais très faible et qui ne m'alloit
point par la quantité de saignées faites sur son corps; les heureux
changemens ne me firent point rompre la résolution prise pour l'opération
ce qui empêcha l'exécution; et lors mes Instrumens que Je vois envoie
en avant ou Je devois me rendre le lendemain; J'envoyai en chercher
mais Je n'en trouvoy point par conséquent Je m'adressay etoient dans
le même cas, pendant ces perquisitions Je mis tout en oeuvre pour
prévenir de nouveaux accidens, Eau de poulet, Emulsions nutritives
bouillons; et à l'aide de tous les remèdes et de l'heureux tempérament
du blessé, il fut en état d'être transporté; cette méthode fut
continué, il ne survint plus d'accidens; Il monta à cheval
le 20. et n'a jamais ressenti la moindre incommodité jusqu'à
d'une santé parfaite, quoique l'enfoncement existât toujours il
est âgé de 45 à 46 ans; Il ne se fust rien à tortige rien aux
mains de tête;



VI Observation

Au mois D'octobre 1746, Le Baron de Chambre de M.^e le Comte
De... reçut deux coups d'épée, Le premier étoit en travers de
muscles extenseurs de la jambe gauche, partie latérale interne & presque
jusqu'à la cuisse, la sortie du fût étoit un pouce plus haute qu'entrée.
Le second fut porté de gauche à droite; à quatre ou cinq pouces à fût de double
pénétrant dans le bas Ventre; le blessé mourut une heure après les coups
reçus; Je fus commis pour faire l'ouverture du cadavre; le bas Ventre n'étoit
point tendu; toute la peau avoit conservé sa forme naturelle; Je fis
l'incision cruciale sur la peau et la graisse; Je dissequai les muscles Epiga-
striques du côté gauche; Je vis que l'épée étoit entrée directement dans le bas
Ventre en travers des obliques; J'en vis le péricône ou Je trouvais immédiatement
sous la surface interne un Ver vivant long de dix à onze pouces, étendu
sur l'épiploon; Je crus que le Ver étoit sorti de quelque Intestin ouvert
par ~~un~~ ^{un} ~~trou~~ pour m'en apercevoir; Je tirai tous des Intestins hors du ventre
dans lequel il y avoit un épanchement considérable de sang; fourni par
l'artere mésentérique coupée en deux; La pointe de l'instrument, l'épée
l'épée! avoit pénétré dans la substance du foie; Je fus donc confirmé
devoir trouver la cause d'une mort si subite.

Il fut question de m'apercevoir d'où venoit le Ver; pour cet effet, Je lavai
les excréments, Je lavai les Intestins en dedans en dehors; Je fis une ligature
au Rectum, Je remplis d'eau par le commencement du duodenum, tous ce
long Canal, duquel il n'en sortit pas une goutte; Je cherchai l'ouverture
Je ne trouvais point; en sentant de quoy Je ~~venais~~ ^{venais} d'eau pour adapter
un soufflet au premier Intestin par le moyen duquel Je les soufflay
comme un ballon; cette expérience fut inutile; Je les ouvris les uns après
les autres; Je ne découvris rien qui put me faire soupçonner le Ver sorti
des Intestins; Le mort pendant son vivant étoit maigre, sec, d'une couleur
plombée, sujet à des douleurs de Ventre, sous la forme de colique; dont les

11
Intervalle étroit plus ou moins long; Je conclusay donc que
Le Ver se nourissoit de la Sérosité filtrée par les glandes, c'est à dire
de laquelle il attaquoit les parties solides en irritant les Intestins
ou le peritoine; douleur égale à celle de coliques Violentes.
Le Ver fut mis dans une phiole ou il vécu quatre ou cinq jours
Sans alimens.

VII. Observation

Le 21^{er} may de 1749 m. Le Comte de . . . au service des Etats
généraux, en retour de Blarckenberg à Bruges dans une
Voiture attelée de quatre Chevaux vigoureux, conduit par un
Postillon yvre qui tomba de son Cheval, les quatre se sentans
en liberté, gagnèrent du terrain en fort peu de temps; cette fuite donna
l'alarme au dit Comte, qui prévoyant le danger qui le menaçoit en
restant dans la voiture, prit la résolution de sauter hors, ~~de la~~
~~voiture~~, mais n'ayant pas pris des mesures bien justes; Il
fut jeté avec force sur le pavé, tombant directement sur l'occipital.
Il resta dans la même attitude, on le fut trouvé sans connaissance
sans mouvement, le corps et les extrémités roides, le sang coulant
des oreilles et du nez, plus fort du côté droit que de l'opposé; Il y
avoit deux linceux jusqu'à la taille, portés fort d'entour sur une
espece de brancard fabriqué sur les linceux le mieux qu'il fut possible,
on envoya sur le chemin des Chirurgiens qui lui firent avaler
quelques Cuillerées d'Eau Cordiale, peu de temps après la parole
et le mouvement revinrent, mais ne survinrent personne
beaucoup, et formant des dis cours sans ordre; Il vomit les alimens,
La bile succéda mêlée de matières glaireuses, voilà l'état dans lequel
Je le trouvay à neuf heures du soir, entouré de trois Chirurgiens
occupés à appliquer un seringue en forme de salotte sur une



Contusion Considerable Elevée et Circoustritte sur toute la partie
 postérieure de la tête, que je fis resper pour l'examiner plus scrupuleusement
 que n'avoient fait les messieurs; Je ne remarquay ny plaie ny apparence
 de fracture; Je fis fomentes toute la tête et la contusion avec de bonne Eau de
 Vie aromatisée, Je prescrivis le *seratum minoris ad Commotionem cerebri*
 en forme de Cataplasme; de Vomitemens bilieux continuos; Je conseillay
 que le malade fut saigné toutes les quatre heures, de sorte qu'il y eut
 trois saignées faites à huit heures du matin, un lavement pour Evacuer
 les Excremens, renouveler le Cataplasme six heures après son application
 tout ce que j'avois dit fut oublié; Je retournay chez le blessé qui n'avoit
 été saigné qu'une fois après légèrement, Je vis les memes accidens persister
 dans toute leur force; Je fis sentir combien il étoit important de ne point
 négliger les saignées abondantes comme d'un unique Remède dans un danger
 aussi évident; qu'il n'étoit pas question d'un épanchement de sang sur
 les meninges qui peut être enlevé par le trepan, mais une forte Commotion
 en un mot un ébranlement du cerveau dans la substance duquel il
 pouvoit se faire un épanchement par la rupture de quelques petits Vaisseaux
 dont sensuivroit un abcès qui seroit peris de malade; Je dis qu'au cas
 (que les accidens persisteroient 24 heures ou 30. après avoir tenu cette conduite
 c'est à dire la perte de Connoissance, de Sentimens, et d'insensibilité il faudroit
 faire les Incisions pour découvrir de franc et appliquer le trepan, qu'il
 n'y eût pas de fracture à la première table par laquelle auroit résisté, mais
 que peut-être la seconde table auroit cédé à la violence de la chute; qu'enfin
 il y auroit le débrutement des Sutures et des Villaines, dont sensuivroit les accidens
 rebelles à tous les moyens;

Je partis de même jour pour me rendre chez moy; ou quelques Jours après
 un Chirurgien de Brudelle fut appelé pour se rendre à Bruges; avec ordre
 de me fournir une relation qu'il avoit reçu du Médecin qui soignoit
 le malade; le rapport me confirma d'autant plus dans l'idée d'une Commotion

au commencement de Febv, se plaignant de vertiges, et d'un grand
 bourdonnement; Il fut saigné du bras et du pied, se leungay; Il fut
 baigné huit ou dix fois; ensuite de quoy J'eluy fis faire une tincture
 pour mettre dans les oreilles, un Regime sobre, J'eluy recommanday
 de ne jamais s'en departir, en sorte quil se porta tres bien depuis
 six mois et plus quil estoit affranchi des remedes

Le Grand, Conseiller Premier Chirurgien de sa M. Mgr
 Le Prince Charles de Lorraine, ly devant Chirurgien ordinaire
 de L'Empereur Regnant, et maître en Chirurgie a Luneville